

ALISHTOP

276 SL

PERINGATAN BAHAYA

- Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan sistem pernafasan.
- Berbahaya terhadap ikan, hewan piaraan, ternak, binatang buruan, binatang liar dan lebah.
- Dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit.

PETUNJUK KEAMANAN

- Pada waktu menggunakan herbisida ini jangan makan, minum atau merokok.
- Pada waktu bekerja dengan herbisida ini, pakailah sarung tangan, topeng muka, masker penutup mulut dan hidung, pakaian berelengan dan bercelana panjang.
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena herbisida ini dengan air dan sabun.
- Setelah digunakan, bersihkanlah semua alat untuk menakar dan mengencerkan herbisida ini, alat penyemprot serta pakaian pelindung dengan air yang banyak.
- Simpanlah di tempat tertutup rapat dan sejuk, terkunci serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan jauh dari api.
- Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan herbisida ini atau bekas wadahnya.
- Jangan membawa ternak masuk ke daerah yang diperlakukan dengan herbisida ini.
- Rusakkanlah wadah bekas dan kemudian timbulah sekurang-kurangnya 0,5 meter di tempat yang jauh dari sumber air dan pemukiman.

GEJALA DINI KERACUNAN

- Muntah-muntah, diare, sesak nafas, badan menggigil, tidak enak badan dan lemah.
- Apabila satu atau beberapa gejala tersebut timbul, segera berhenti bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan segera minta pertolongan dokter.

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA

- Tanggalkan pakaian yang terkena herbisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.
- Apabila herbisida ini mengenai mata cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama lebih kurang 15 menit.
- Apabila herbisida tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberikan segelas air hangat yang dicampur satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih. Dengan memberikan sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan.
- Apabila herbisida terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu diberikan pernafasan buatan melalui mulut dengan pemberian oksigen. Bawalah segera penderita ke dokter terdekat dengan membawa wadah herbisida ini yang berlabel.

PERAWATAN OLEH DOKTER

- Belum ada antidot yang khusus untuk formulasi ini. Lakukan perawatan sesuai dengan gejala yang timbul. Jika penderita muntah, berikan salah satu :
- Karbon aktif (norit) 100 gram untuk dewasa atau 2g/kg berat badan untuk anak-anak.
 - Pencuci perut mannitol atau magnesium sulfat.
 - Fuller's earth larutan 15%, 1 liter untuk dewasa atau 15 ml/kg berat badan untuk anak-anak.



alishter

Aliansi Stewardship Herbisida Terbatas

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI
SIMPANLAH DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK,
KOCOK TERLEBIH DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN

HERBISIDA UNTUK PENGGUNAAN TERBATAS, HANYA DIGUNAKAN
OLEH PENGGUNA YANG BERSERTIFIKAT

ALISHTOP

276 SL

HERBISIDA TERBATAS

Bahan Aktif :
parakuat diklorida 276 g/l
(setara dengan ion parakuat 100 g/l)

Nomor Pendaftaran :
RI. 01030120186161

Herbisida kontak purna tumbuh, berbentuk larutan dalam air, berwarna biru kehijauan, untuk mengendalikan gulma berdaun lebar, gulma berdaun sempit dan teki di pertanaman jagung (TOT), kelapa sawit (TBM), kopi (TBM) dan padi sawah (TOT).

Isi bersih : 500 ml



Petunjuk Penggunaan

Tanaman dan Gulma Sasaran	Dosis	Cara dan Waktu Aplikasi
Budidaya Kopi (TBM) Gulma berdaun lebar <i>ageratum conyzoides</i> Gulma berdaun sempit <i>setaria plicata</i>	1,5 - 3 l/ha 1,5 - 3 l/ha	Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat penutupan gulma sudah mencapai 75%. Volume semprot 400 - 500 l/ha
Kelapa Sawit (TBM) Gulma berdaun lebar <i>borreria alata</i> Gulma berdaun sempit <i>ottochloa nodosa</i>	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha	Aplikasi dilakukan dengan cara penyemprotan volume tinggi pada saat gulma tumbuh aktif. Volume semprot 400 - 500l/ha
Padi Sawah (TOT) Gulma berdaun lebar <i>ludwigia octovalvis</i> Gulma berdaun sempit <i>echinochloa spp</i> Teki <i>cyperus iria</i>	1,5 - 2 l/ha 1,5 - 2 l/ha	Penyemprotan dilakukan 7 hari sebelum padi sawah ditanam dengan menggunakan nozel biru dan volume semprot 500 l/ha
Persiapan Jagung (TOT) Gulma berdaun lebar <i>synedrella nodiflora</i> Gulma daun sempit <i>digitaria ciliaris</i>	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha	Penyemprotan dilakukan 10 hari sebelum jagung ditanam dengan menggunakan nozel biru dan volume semprot 500 l/ha

Diproduksi pada : 18 Februari 2018
No. kode produksi : 17JT2018
Bulan dan tahun kadaluarsa : 18 Februari 2023

Produsen dan Pemegang Nomor Pendaftaran :
PT. ALISHTER
Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon (021) 83692910

Distributor Utama :
PT. Maju Bersama - Jakarta